


Pelléade à stipe pourpre

Pellaea atropurpurea



Régions administratives où l'espèce pourrait être observée :
03, 07





Pelléade à stipe pourpre

Pellaea atropurpurea



- A:** Petite fougère vivace dont la tige de la fronde est rigide, couverte de nombreux poils, et dont la couleur varie de brun pourpre à presque noire.
- B:** Présente des frondes stériles et des frondes fertiles mesurant de 10 à 35 cm de long et de 3,5 à 9 cm de large. Les segments stériles sont ovales à sommet arrondi, tandis que les fertiles sont étroits, linéaires et pointus.
- C:** Les sores sont disposés en continu sous le rebord recourbé des segments du limbe.



- Croît sur des falaises, des escarpements, des talus d'éboulis et des rives rocheuses, sur du calcaire ou du marbre.
- Préfère les milieux ouverts et très secs, orientés vers le sud.



- La meilleure période pour l'observer est la saison de croissance, qui s'étend du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne.

Si vous **observez cette plante**, informez-vous des mesures de protection touchant cette espèce qui sont disponibles sur la fiche descriptive complète. Veuillez signaler votre observation au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) :

Québec.ca/centre-donnees-especes

