

Claytonie de Virginie

Claytonia virginica

A



Régions administratives où l'espèce pourrait être observée :
05, 06, 07, 14, 15, 16

B



C





Claytonie de Virginie

Claytonia virginica



- A:** Plante herbacée vivace, mesurant de 10 à 25 cm. Elle fleurit très tôt au printemps et disparaît complètement à la fin de mai.
- B:** Elle porte de 5 à 15 petites fleurs regroupées en grappe au sommet de la tige. Leur diamètre varie de 5 à 12 mm. Chaque fleur est formée de deux courts sépales verts et de cinq pétales blancs ou rosés, veinés de rose foncé.
- C:** Elle porte deux feuilles, opposées, entières, lancéolées, huit fois plus longues que larges.



- Croît dans des marécages boisés et des forêts feuillues dominées par l'érable argenté, l'érable rouge, le frêne rouge, l'orme d'Amérique ou le chêne à gros fruits.
- L'espèce a également été observée dans des forêts de hêtre à grandes feuilles ou d'érable à sucre.



- La meilleure période pour l'observer est tôt au printemps, au moment de sa floraison.

Si vous **observez cette plante**, informez-vous des mesures de protection touchant cette espèce qui sont disponibles sur la fiche descriptive complète. Veuillez signaler votre observation au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) :

Québec.ca/centre-donnees-especes

