



La
RAGE,
c'est
MORTEL!



Bilan des opérations de surveillance de la rage du raton laveur en 2020


La rage est une maladie mortelle qui peut affecter tous les mammifères, y compris les humains.

De ce fait, les enjeux de santé publique sont importants et justifient le maintien d'une surveillance adéquate chez les animaux sauvages.

La surveillance rehaussée de la rage du raton laveur au Québec a pour but de détecter rapidement tout cas dans les régions jugées à risque d'introduction, soit la Montérégie et l'Estrie.

Cette surveillance est effectuée en récupérant des ratons laveurs, moufettes et renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés. Des analyses de laboratoire sont ensuite effectuées afin de déterminer si ces spécimens sont atteints ou non de la rage.

En 2020, la zone de surveillance rehaussée de la rage du raton laveur visait 143 municipalités, territoires autochtones et territoires non organisés de l'Estrie et de la Montérégie, pour une superficie totale de 11 541 km².



Légende

- Spécimens récoltés et analysés pour la rage en 2020
- Zone de surveillance - 2020

Métadonnées

Projection cartographique
Conique Lambert

Système de référence géodésique
NAD 83

1:1 136 668

0 10 20 40 km

Sources des informations géographiques

BOTA 1:250 000 MERN


BDGA 1:1 000 000 MERN

Réalisation

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Service de la conservation de la biodiversité
et des milieux humides

© Gouvernement du Québec, 2021


Note: Le présent document n'a aucune portée légale



Québec

Carte : Répartition des spécimens récoltés dans le cadre de la surveillance de la rage du raton laveur au Québec, entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2020.

Les opérations de surveillance, menées tout au long de l'année, ont permis de récupérer et d'analyser un total de 1 175 animaux sauvages (malades ou morts). Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2017, où 1 191 spécimens avaient alors été récupérés. Le nombre de spécimens récoltés par année oscille normalement entre 700 et 1 200.



Nombre de spécimens récoltés, par région, dans le cadre de la surveillance de la rage du raton laveur en 2020.

N.B. À l'occasion, des spécimens signalés à l'extérieur de la zone de surveillance sont récupérés, lorsqu'ils présentent un intérêt pour la surveillance de la rage.



Audrey Crevier pour le MFFP

UN SIGNALEMENT NE MÈNE PAS TOUJOURS À UNE RÉCUPÉRATION DE L'ANIMAL.

Voici quelques exemples :


- Animal qui n'est plus disponible au moment de la récupération;
- Animal qui ne se retrouve pas dans une des municipalités visées;
- Animal qui ne présente pas de symptômes compatibles avec la rage;
- Animal qui n'est pas une espèce visée;
- Animal mort qui est dans un état de décomposition trop avancé pour qu'un test de rage puisse être effectué;
- Animal importun.



Audrey Crevier pour le MFFP

ANIMAUX RÉCOLTÉS ET RÉSULTATS D'ANALYSE

Les animaux récupérés dans le cadre de la surveillance rehaussée proviennent de deux sources principales, soit de signalements des citoyens ou d'animaux sauvages victimes de collisions routières. Les signalements de citoyens représentent le meilleur moyen pour trouver les animaux sauvages atteints de la rage. En effet, lorsque cette maladie se trouve dans un secteur, des animaux sauvages ayant des comportements étranges ou qui sont sans crainte des humains sont observés, et ce, même de jour, ce qui est contraire aux habitudes de plusieurs espèces.



Provenance des 1 175 spécimens récoltés en 2020.

SIGNALEMENTS REÇUS DE CITOYENS

Nous avons reçu un total de 1 117 signalements en 2020, soit un sommet depuis 2012 où 1 226 signalements avaient été faits. Habituellement, ce nombre varie de 500 à 1 200 signalements reçus et traités chaque année.


Parmi les signalements reçus en 2020, 403 d'entre eux ont mené à la récupération d'un animal suspect, ce qui représente 36 % des signalements.

RÉSULTATS DES ANALYSES

Aucun cas de rage du raton laveur n'a été détecté au Québec en 2020. Les résultats des analyses de rage sont les suivants :

- 1 149 spécimens négatifs;
- 26 spécimens non concluants ou non échantillonnés (carcasse trop décomposée, écrasée ou encore échantillon impropre).

La surveillance rehaussée cible principalement les ratons laveurs, moufettes et renards qui sont considérés comme les espèces les plus à risque. À l'occasion, d'autres espèces peuvent faire l'objet d'une récupération si elles présentent des signes compatibles avec la rage.



Répartition, par espèce, des spécimens récoltés en 2020.