


Mouffette rayée

Cycle de vie



Le cycle de vie de la mouffette rayée débute par l'accouplement, qui se déroule du début mars à la mi-avril. Celui-ci est suivi de la gestation des petits, qui se déroule jusqu'à leur naissance, entre la fin mai et le début juin. L'élevage des jeunes se fait jusqu'à la fin août. La période d'hivernation débute à la fin novembre et se termine au début avril.

L'**accouplement** est la période durant laquelle survient la copulation. La **gestation** est la période durant laquelle le fœtus se développe dans le corps de la femelle. La **naissance** est la période où les petits viennent au monde. L'**élevage des jeunes** est la période où les petits sont dépendants de leur mère ou de leurs parents. Cela inclut la période d'allaitement mais aussi, une fois les

jeunes sevrés, la période d'apprentissage. Cette période se termine lorsque les jeunes quittent leur mère et se dispersent. L'**hivernation** est une période où l'animal réduit ses activités et son métabolisme mais où il demeure partiellement actif. En général, il ne s'alimente pas ou très peu et il vit sur ses réserves de graisse accumulées durant l'automne. Il dort mais se réveille aussi périodiquement. Les mouffettes sortent même de leur tanière à quelques reprises, notamment pour s'accoupler.

Pour en savoir plus, consultez la [fiche de la mouffette rayée](#).