

Bilan régional du cerf de Virginie de la zone 11 est en 2025

Direction régionale de la gestion de la faune de Lanaudière et des Laurentides



Mise en contexte

L'abondance des populations de cerfs de Virginie au Québec varie d'une région à l'autre, principalement selon la qualité de l'habitat et la rigueur de l'hiver. Les modalités de gestion du cerf sont ainsi adaptées pour tenir compte des particularités de chaque zone de chasse. Ce bilan régional présente une synthèse de l'état des populations de cerfs dans la zone 11 est basée sur les tendances de certains indicateurs du système de suivi du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette zone est située dans les Laurentides.

Portrait général de la zone

La zone de chasse 11 est a une superficie de 4 001 km², dont environ 3 076 km² d'habitat propice au cerf. Le domaine bioclimatique de l'érablière à bouleau jaune caractérise l'ensemble de la zone 11 est.

L'indicateur de la rigueur de l'hiver pour le cerf (NIVA) montre que depuis 2010, la majorité des hivers dans la zone sont de rigueur intermédiaire, ce qui favorise la stabilité des populations. Toutefois, les trois dernières années ont été relativement faciles et ont permis un accroissement du cheptel.




Figure 1. Carte de la zone de chasse 11 est.





Figure 2. Nombre d'hivers selon leur rigueur pour le cerf, évaluée par l'indice NIVA (jours-centimètres d'enfoncement dans la neige) de 2010 à 2025 pour la zone 11 est.

Facile : < 3 000 jours-cm; Intermédiaire : de 3 000 à 4 999 jours-cm; Difficile : ≥ 5 000 jours-cm.

Portrait de la chasse sportive




Les densités de récolte de cerfs plus élevées se trouvent dans le sud de la zone et dans le secteur de Mont-Laurier

Figure 3. Densité de la récolte (cerfs/100 km²) en 2025.

Surveillance de la maladie débilante chronique des cervidés

Le ministère effectue une [surveillance de la maladie débilante chronique des cervidés](#) dans les zones ayant de fortes densités de cerfs ou un nombre relativement élevé de sites où des cervidés sont gardés en captivité. La zone 11 est fait partie de ces zones.

Lors du dépôt d'une tête de cerf dans une boucherie qui participe au programme, assurez-vous d'avoir en main votre permis de chasse et que votre coupon de transport est apposé sur la tête. Les têtes dont la calotte a été retirée peuvent également être soumises, car les structures analysées se trouvent à la base de la mâchoire. Merci de contribuer au suivi de la santé de la faune!



La récolte est en croissance depuis 2020.

En 2024 et 2025, la récolte totale et la récolte de mâles adultes ont été les plus élevées des dix dernières années.

Figure 4. Évolution de la récolte de cerfs, de la vente de permis et des occurrences d'hivers difficiles (NIVA) dans la zone 11 est.
Note : Le permis de chasse au cerf est associé à la zone depuis 2020.




Figure 5. Évolution du succès de chasse (pourcentage des chasseurs ayant récolté un cerf) dans la zone 11 est.

Constats généraux

La récolte et le succès de chasse sont en croissance dans la zone 11 est depuis 2020. Le nombre de chasseurs croît légèrement, avec une moyenne de 4 960 par an.

Dans cette zone, la rigueur de l'hiver influence grandement le cheptel, qui récupère relativement rapidement à la suite d'un hiver difficile qui cause une mortalité plus élevée. L'hiver 2026 s'annonce plutôt rigoureux. Le suivi de la rigueur de l'hiver par la prise de mesures bimensuelles dans les ravages sera un élément clé de l'analyse permettant de déterminer si des permis de cerfs sans bois seront attribués par tirage au sort pour la saison de chasse 2026.

Nourrissage artificiel : des conséquences pour les cerfs

Il est [interdit de nourrir artificiellement des cerfs de Virginie](#) en dehors des périodes de chasse, soit du 1^{er} décembre au 31 août.

Cette interdiction vient du fait que nourrir artificiellement les cerfs peut leur causer des problèmes de santé comme :

- un déséquilibre énergétique (les cerfs dépensent plus d'énergie à digérer leur nourriture que ce qu'ils en retirent);
- des diarrhées, des ballonnements et la ruminite, soit une inflammation de la panse (rumen) qui peut provoquer une mort rapide.

De plus, le nourrissage conduit notamment à :

- la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie, à la dégradation de l'habitat ainsi qu'à des dommages à la propriété privée près des sites de nourrissage;
- l'attraction des prédateurs;
- l'augmentation du nombre d'accidents routiers;
- la transmission de maladies et de parasites;
- l'augmentation locale potentielle de la présence de la tique à pattes noires associée à la transmission de la maladie de Lyme;
- la facilitation d'activités de braconnage

Pour en savoir plus sur le cerf de Virginie

[Statistiques de récolte](#)



[Cerf de virginie](#)



[Plan de gestion](#)



[Système de suivi](#)



[Chasse au cerf](#)



[Fin de semaine de la relève](#)

