

Bilan régional du cerf de Virginie de la zone 27 ouest en 2024

Direction de la gestion de la faune de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches



Mise en contexte

L'abondance des populations de cerfs de Virginie au Québec varie entre les régions, principalement selon la qualité de l'habitat et la rigueur de l'hiver. Les modalités de gestion du cerf sont ainsi adaptées pour tenir compte des particularités de chaque zone de chasse. Ce bilan régional présente une synthèse de l'état des populations de cerfs dans la zone 27 ouest, basée sur les tendances de certains indicateurs du système de suivi du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette zone est située dans la région de la Capitale-Nationale.

Portrait général de la zone

La zone de chasse 27 ouest, créée en 2004, a une superficie de 17 209 km², dont environ 4 710 km² d'habitat propice au cerf. Celui-ci se trouve principalement dans le paysage agroforestier du sud de la zone, associé aux domaines bioclimatiques de l'érablière à tilleul et de l'érablière à bouleau jaune.

L'indicateur de la rigueur de l'hiver pour le cerf (NIVA) montre que, depuis 2010, la majorité des hivers dans la zone sont de rigueur intermédiaire, ce qui favorise la stabilité des populations.




Figure 1. Carte de la zone de chasse 27 ouest.





Figure 2. Nombre d'hivers selon leur rigueur pour le cerf, évaluée par l'indice NIVA (jours-centimètres d'enfoncement dans la neige) de 2010 à 2024 pour la zone 27 ouest.

Hiver facile : < 3 000 jours-cm;
intermédiaire : de 3 000 à 4 999 jours-cm;
difficile : ≥ 5 000 jours-cm.

Portrait de la chasse sportive




Les densités de cerfs sont les plus fortes dans la partie sud-ouest de la zone.

Figure 3. Densité de la récolte (cerfs/100 km²) en 2024.

Saviez-vous que?

Malgré la position nordique de la zone 27 ouest, la population de cerfs montre une grande résilience aux impacts des hivers rigoureux et elle récupère complètement après deux ans lorsque les conditions hivernales sont clémentes.

Cette zone tolère bien une récolte de cerfs sans bois contingentée (tirage au sort) et elle est actuellement à un sommet historique de densité.



La récolte totale a doublé depuis 2019, l'année du dernier hiver difficile pour le cerf.

La récolte de mâles adultes atteint des sommets depuis 2022.

Figure 4. Évolution de la récolte de cerfs, de la vente de permis et de l'occurrence d'hivers difficiles (NIVA) dans la zone 27 ouest. Note : Le permis de chasse au cerf est associé à la zone depuis 2020.




Figure 5. Évolution du succès de chasse (% des chasseurs ayant récolté un cerf) dans la zone 27 ouest.

Constats généraux

La récolte et le succès de chasse sont élevés, considérant les modalités restrictives des zones marginales en vigueur. Les indicateurs confirment que les populations de cerfs ne sont plus marginales dans la zone 27 ouest et que le potentiel de récolte est maintenant comparable à celui des zones de chasse à faible densité de cerfs.

Quoi de neuf?

La Direction de la gestion de la faune de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches a réalisé, en 2023 et 2024, un inventaire printanier faune-forêt de l'aire de confinement Long-Montauban, soit le plus grand ravage de cerfs de la zone 27 ouest. Nous avons pu confirmer l'utilisation relative des habitats et leur qualité. Ces données permettront de guider l'élaboration du plan d'aménagement forestier de ce ravage qui vise à conserver un habitat hivernal adéquat pour le cerf.

Durant la période sans neige, des cerfs sont maintenant observés profondément dans les vallées du massif des Laurentides, ce qui montre que la population continue d'accroître son aire de répartition vers le nord de la zone.

Pour en savoir plus sur le cerf de Virginie

Statistiques de récolte



Cerf de virginie



Plan de gestion



Système de suivi



Chasse au cerf



Fin de semaine de la relève

